

# 花草園地

圖、文：薛人維



● 大紫葳

## 寶蓮花 *Medinilla magnifica* (刊頭圖說)

野牡丹科常綠灌木，原產菲律賓。夏季開花，花色粉紅，苞片大，與朵朵小花相結合，串起一層層如珍珠般之花序，呈垂懸狀，十分壯麗。葉對生或輪生，卵狀橢圓形。地上植株可達二至三公尺，盆栽約一公尺左右。繁殖可用高壓法，春、夏兩季為適期。生育適溫約攝氏22至28度，性喜高溫，栽種地點濕度高生育旺盛，以半日照地點為佳。冬季須注意防寒。

## 火球花 *Haemanthus multiflorus*

石蒜科球根花卉，別名紅繡球，原產非洲。花朵形狀特殊，由上百朵小花組成，圓球狀之繖形花序，顏色鮮紅，開花十分引人注目。地下球莖呈扁圓形，栽種一段時間後，母球能著生小球，通常以分株小球繁殖成新株。生育適溫約攝氏25至30度，性喜高溫耐旱，是典型夏季花卉植物。冬季進入休眠期，地上部莖葉枯萎，僅剩地下球莖，須安置盆內過冬，隔年春、夏兩季再生長開花。

## 大紫葳 *Saritaea magnifica*

紫葳科常綠蔓性藤本，原產哥倫比亞。花色鮮紫紅色，喉部白色帶橙黃色條紋，花形為筒狀鈴形，全年都能開花，花朵盛開十分艷麗動人。葉對生，二出複葉，小葉倒卵形。枝條粗壯，適合架設花棚、花架或籬牆美化。繁殖用扦插法，以春季為適期。生育適溫約攝氏22至30度，性喜高溫，栽種地點日照要充足。冬季須溫暖避風越冬。

## 金鳥赫蕉 *Heliconia rostrata*

旅人蕉科多年生草本，原產熱帶美洲。株高約一至二公尺，花苞似五彩繽紛之小鳥狀，奇特美麗。葉長橢圓形，具長柄。適合庭園叢植、列植美化。繁殖用分株法，以春、夏兩季為佳。生育適溫約攝氏22至30度，性喜高溫多濕，栽培土壤保濕性與排水性須良好，尤其春季開始進入生長旺盛期，須注意補充水分。冬季須強剪，剪除開過花的老莖，並保持溫暖越冬。



● 火球花



● 金鳥赫蕉

# 飛羽婆婆的 鳥類世界

圖、文：吳錫欽



## 黃頭鷺

冬羽全身白色，繁殖期頭、頸部會出現黃色飾羽。常跟隨牛隻或耕耘機附近吃蟲，故又名「牛背鷺」，以昆蟲、青蛙、小魚為食。



## 栗小鷺

雄鳥背面栗紅色；雌鳥背面暗褐色。通常單獨出現於池塘、沼澤、水田等草叢地帶，覓食或高唱時，脖子伸長為體長的二倍。



## 夜鷺

俗名「暗光鳥」，嘴黑、腳黃、眼紅色，頭頂至背部藍黑有光澤。大多於晨昏或夜間活動，以魚、蝦、昆蟲等為主食。



## 黃小鷺

體色棕黃，飛羽、尾羽黑色。常單獨出現於沼澤、池塘、草叢地帶。覓食時，伸長頸部注視不動；警戒時，伸直頸部頭朝天佇立不動。

# 暗夜裡的精靈

圖、文：劉上平



## 日本樹蛙之鬥

日本樹蛙在生殖聚集時，為取得和雌蛙的交配權，雄蛙之間會以壓制、鳴叫、示威...的方式驅趕對方。藉此，讓族群中強勢的基因，得以延續下去。



## 諸羅樹蛙之愛

諸羅樹蛙是嘉南平原特有的綠色樹蛙，雄蛙以鳴聲吸引雌蛙前來交配，雌蛙體型龐大，雙方抱接後，會移至濕地的隱密處踢卵泡。



## 蛾之食

地面潮濕積水處，在夜間常見蛾類聚集。蛾類利用吸管狀的口器將水吸入，在體內吸收其中的礦物質之後，將多餘的水分由尾部迅速排出。



## 百步蛇 (曾志明 攝)

中大型有毒蛇類，吻端向上翹起，體側有褐色三角形斑紋，為排灣族常用的圖騰。平時停棲在落葉林底層，以啣齒目動物、鳥類為主要食物。